Table 2
Risk ratio of lung cancer (all histologies combined) for various smoking parameters

	Cases ($n = 482$)	Controls ($n = 1094$)	OR	95% CI
No. of cigarettes day				
Nonsmoker	23	309	1.0	—
1–19	81	434	2.5	1.5–4.1
20–39	224	288	10.4	6.6–16.5
≥40	154	63	32.8	19.6–55.0
Duration of smoking (years)				
Nonsmoker	23	309	1.0	—
1–29	16	61	3.5	1.8–7.1
30–49	307	370	7.5	4.8–11.9
≥50	236	354	9.0	5.7–14.1
Starting age (years)				
Nonsmoker	23	309	1.0	—
≥20	72	152	6.4	3.8–10.2
16–19	161	338	6.4	4.0–10.2
<16	226	295	10.3	6.5–16.3
Years since quitting				
Nonsmoker	23	309	1.0	—
≥15	63	213	4.0	2.4–6.6
5–14	63	133	6.4	3.8–10.7
1–4	88	123	9.6	5.8–15.9
Never quitter	245	316	10.4	6.6–16.4
Smoked filter cigarettes				
Nonsmoker	23	309	1.0	—
Yes	173	440	5.3	3.3–8.4
No	284	334	11.4	7.3–18.0
Inhaled the smoke				
Nonsmoker	23	309	1.0	—
No	43	415	1.4	0.8–2.4
Yes	413	361	15.4	9.8–24.0

Khuder S.A., Dayal H.H., Mutgi A.B., Willey J.C., Dayal G., Effect of cigarette smoking on major histological types of lung cancer in men, *Lung Cancer*, V.22, pp. 15-21, 1998

PM3001135135

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rjhk0001